

Памятка по профилактике желтой лихорадки для выезжающих за рубеж

Желтая лихорадка – вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров.



Ежегодно в мире регистрируется от **84 000 до 170 000 случаев заболевания.**

Заболевание существует в двух формах: лихорадка джунглей (передается комарами от зараженных обезьян) и лихорадка населенных пунктов (передается комарами от человека к

человеку), которая вызывает большинство вспышек и эпидемий.

Природным резервуаром желтой лихорадки являются, главным образом, обезьяны.

Инкубационный период заболевания – 6 дней. Заболевание характеризуется острым началом, лихорадкой, тяжелой интоксикацией, тромбогеморрагическим синдромом, поражением почек и печени.

"Желтой" она называется из-за желтухи, развивающейся у некоторых пациентов.

Около половины людей, у которых развивается тяжелая форма болезни, умирают.

Специфического лечения желтой лихорадки не существует. Возможно лишь симптоматическое лечение, направленное на ослабление симптомов для более комфортного состояния пациентов.



Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки является самым надежным средством предупреждения заболевания. Вакцинация против желтой лихорадки осуществляется вакцинами, сертифицированными ВОЗ. Иммуитет после введения вакцины против желтой лихорадки вырабатывается через 10 дней и сохраняется в

течение всей жизни. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-и месячного возраста.

Напоминаем: прививка против желтой лихорадки проводятся:

— УЗ «19 центральная районная поликлиника
Первомайского района

г.Минска» (пр. Независимости, 119, тел. 8017 3740722)



Вакцинация проводится после предъявления справки установленного образца, выданной врачом организации здравоохранения по месту жительства гражданина, об отсутствии противопоказаний к вакцинации.

После проведения прививки выдается Международное свидетельство о вакцинации (действительно в течении всей жизни).

Страны эндемичные по желтой лихорадке (при въезде в которые каждому путешественнику **рекомендуется** проведение вакцинации против желтой лихорадки):

В Африке: Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Судан, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея Эфиопия **В Центральной и Южной Америке:** Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго Эквадор

Требуется наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки при выезде в страны:

В Африке: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо Бурунди, Габон Гана, Демократическая республика Конго, Камерун, Конго, Кот-д' Иву ар, Либерия, Мали, Нигер, Руанда, Сьерра-Леоне, Того, Центрально-Африканская Республика.

В Южной Америке: Гвиана Французская



Меры профилактики:

При нахождении в неблагополучных странах, регионах необходимо:

✚ применение репеллентов от комаров;
✚ использование противомоскитных пологов на кроватях;

- ✚ не открывать окна в помещениях;
- ✚ для проветривания помещения лучше всего использовать кондиционеры и другие подобные технические средства;
- ✚ защищаться от укусов комаров, носить рубашки с длинным рукавом и брюки;
- ✚ не использовать воду, в которой могут размножаться личинки комара (баки, открытые контейнеры, водоемы).

После возвращения из неблагополучного региона: следить за температурой тела, при обнаружении у себя первых симптомов лихорадки незамедлительно обратиться за медицинской помощью; информировать медработников о своем пребывании в неблагополучном регионе.